

# Инструкция

## по медицинскому применению препарата

### Лив. 52®

---

**Регистрационный номер:** П N014783/01

**Торговое название:** Лив.52®

**Лекарственная форма:** таблетки.

### Состав

Каждая таблетка содержит:

#### Активные компоненты:

#### Порошки:

Каперсов колючих корней	<i>Capparis spinosa auct.non.L.</i>	65,0 мг
Цикория обыкновенного семян	<i>Cichorium intybus L.</i>	65,0мг
Паслена черного целого растения	<i>Solanum nigrum L.</i>	32,0мг
Терминалии аржуна коры	<i>Terminalia arjuna</i> (Roxb.)Bedd.	32,0мг
Кассии западной семян	<i>Cassia occidentalis L.</i>	16,0 мг
Тысячелистника обыкновенного травы	<i>Achillea millefolium L.</i>	16,0мг
Гамарикса галльского целого растения	<i>Tamarix gallica L.</i>	16,0 мг
Железа (III) оксида	<i>Ferrum oxidum</i>	33,0 мг

Которые обработаны над паром экстракта из смеси следующего растительного сырья:

*Eclipta alba* Hassk. (Эклипты белой целого растения), *Phyllanthus amarus* Schum.et.Thonn. (Филантуса нирури целого растения), *Boerhaavia diffusa* L. (Берхавии раскидистой корней), *Tinospora cordifolia* Miers. (Тиноспоры сердцелистной стеблей), *Raphanus sativus* L. (Редьки посевной корнеплодов), *Emblica officinalis* Gaertn. (Эмблики лекарственной плодов), *Plumbago zeylanica* L. (Свинчатки цейлонской корней), *Embelia ribes* Burm.f. (Эмбелии смородиновой плодов), *Terminalia chebula* Retz.

(Терминалии хебулы кожуры плодов), *Fumaria officinalis* L. (Дымянки лекарственной целого растения).

**Вспомогательные вещества:**

Магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кармеллоза натрия.

**Описание**

Круглые двояковыпуклые таблетки зеленовато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета

**Фармакотерапевтическая группа**

Гепатопротекторное средство растительного происхождения.

**Код АТХ** [A05BA]

**Фармакологическое действие**

Комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, входящих в состав препарата Лив.52®, нормализует белковосинтетическую функцию печени, стимулирует восстановление клеток печени, оказывает желчегонное действие, предохраняет печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты и т.д.), способствует улучшению процесса пищеварения.

**Показания к применению**

В качестве лечебно-профилактического средства при:

- острым гепатите А;
- острых и хронических гепатитах В и С;
- токсических гепатитах, в т.ч. лекарственных;
- анорексии;
- алкогольной болезни печени;
- прецирротических состояниях;
- в курсе профилактики гепатотоксичности антибиотиков, противотуберкулезных, жаропонижающих препаратов, контрацептивов

и других гепатотоксичных лекарственных средств, профилактика анорексии в курсе лучевой и химиотерапии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Желчнокаменная болезнь. Детский возраст до 6 лет. Беременность и период лактации.

**С осторожностью** назначают больным с острыми заболеваниями желудка и кишечника.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, за 15-30 минут до еды.

В качестве профилактического средства: по 2 таблетки 2 раза в сутки.

В качестве лечебного средства:

дети старше 6 лет – по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки;

взрослые – 2-3 таблетки 2-3 раза в сутки.

### **Применение при отдельных заболеваниях.**

#### ***При острых вирусных гепатитах А, В или С:***

дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;

взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;

курс терапии 2-3 месяца.

#### ***При хронических вирусных гепатитах В и С:***

дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;

взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;

курс терапии 6 месяцев.

#### ***При анорексии:***

дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;

взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;

Продолжительность курса терапии 2 недели. При необходимости курс терапии может быть продолжен после 2 недельного перерыва.

**Как гепатопротекторное средство в курсе противотуберкулезной терапии и при применении других гепатотоксичных лекарственных препаратов, в т.ч. в целях профилактики анорексии в курсе лучевой и химиотерапии:**

дети с 6 лет: по 1 таблетке 2 раза в день;

взрослые: по 2 таблетки 2 раза в день.

Препарат принимают вместе с противотуберкулезными препаратами и другими химиопрепаратами, продолжительность курса лечения соответствует продолжительности курса химиотерапии.

**При алкогольной болезни печени:**

по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 1 месяца, затем по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 6–12 месяцев.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции и диспепсические нарушения; редко — послабление стула у пациентов с нарушением процессов пищеварения и абсорбции и/или диареей в анамнезе.

### **Взаимодействие с другими препаратами**

Лив.52 снижает концентрацию ибупрофена крови, возможно благодаря замедлению всасывания. Препарат снижает биодоступность тетрациклина и доксициклина.

### **Форма выпуска**

Таблетки. По 100 таблеток в пластиковый флакон из полиэтилена высокой плотности с навинчиваемой крышкой. Горлышко флакона дополнительно затянуто алюминиевой фольгой с нанесенным на неё товарным знаком фирмы. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в картонную пачку

### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре от + 10 °С до + 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

“Хималайя Драг Ко”,

Макали, Бангалор 562 123, Индия.

**Эксклюзивный дистрибьютор /****организация, принимающая претензии потребителей**

ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия.

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 1.

тел.: (495) 775-39-38,

факс: (495)514-10-54/67.